



ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

НЕО-АНГИН® череша

1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg таблетки за смучене
2,4 - дихлоробензилов алкохол/амилметакрезол/левоментол

neo-angin® cherry

1,20 mg/0,60 mg/5,90 mg lozenges
2,4 - dichlorobenzyl alcohol/amylnmetacresol/levomenthol



Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Нео-ангин® череша.

Консултирайте се с Вашия лекар в случай, че посоченото се отнася за Вас:

- Ако симптомите на инфекция на устната кухина и фаринкса продължават повече от 3-4 дни или дори се влошават, моля да се консултирате с Вашия лекар.
- Ако страдате от хронична кашлица или дрезгавост на гласа, моля да се консултирате с Вашия лекар преди да започнете да приемате Нео-ангин® череша. Тези прояви може да бъдат също симптоми на евентуални злокачествени заболявания.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нео-ангин® череша и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин® череша
3. Как да приемате Нео-ангин® череша
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нео-ангин® череша
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Нео-ангин® череша и за какво се използва

Нео-ангин® череша е антисептичен терапевтичен продукт, притежаващ леко обезболяващо действие за устата и гърлото.

Той е предназначен за локално, ранно лечение на леки възпаления на лигавиците на устната кухина и гърлото, което също така може да помогне да се намали необходимостта от използване на антибиотици. Тези инфекции предизвикват възпаление на устната кухина и гърлото със симптоми, като болки в гърлото и дрезгавост на гласа, възпаление на устната лигавица и венците.

Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин® череша

Не приемайте Нео-ангин® череша

- Ако сте алергични (свърхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка б).
- При деца под 6 годишна възраст

Деца

Не давайте Нео-ангин® череша на деца под 6 годишна възраст. За лечение с Нео-ангин® череша, децата трябва да могат контролирано да смучат таблетки.

Други лекарства и Нео-ангин® череша.

Не са известни взаимодействия с други лекарствени продукти.

Не се препоръчва едновременното приложение с други продукти, които действат на устната кухина и лигавиците.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Нео-ангин® череша с храни, напитки и алкохол

Няма данни, показващи че храната или напитките оказват влияние върху действието на Нео-ангин® череша. Не приемайте храна или напитки непосредствено след приема на Нео-ангин® череша, за да се избегне извличането на активното вещество от лигавицата на устата и фаринкса.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бременност

Няма клинични данни за вредни ефекти на Нео-ангин® череша таблетки за смучене по време на бременност. Данните от проведените проучвания при опитни животни не показват директни или индиректни увреждащи ефекти по отношение на бременността, развитието на ембриона/плода, раждането и послеродовото развитие.

Поради отсъствието на достатъчно информация не е възможно напълно да се изключат рисковете за плода и по тази причина не се препоръчва използване на лекарствения продукт по време на бременност.

Кърмене

По време на кърмене Нео-ангин® череша трябва да се предписва само след внимателна оценка.

Шофиране и работа с машини

Ефектът на този лекарствен продукт върху способността за шофиране и работа с машини е неизвестен. Въпреки това е малко вероятно те да бъдат нарушени.



32 013 041 03P0120 264 151463BG

Bezeichnung: PB neo-angin Kirsch Inhalt: - Artikel-Nr.: 151463 Material-Nr.: 32 013 041 Druck-Kennz.: 03P0120 Laetus-Code: 264 AG-Nr.: - EAN-Code: - PZN-Code: - Land: BG Zeichn.-Nr.: -	Format: 190 x 210 mm Druckfarben: 1) ■ Black 2) 3) 4) 5) 6) 7)	Lackausparung: I) - II) - III) - IV) - V) - Lack: <input type="checkbox"/> Lackfrei: <input type="checkbox"/> Effekt-Lack: <input type="checkbox"/> Prägung: <input type="checkbox"/>	Verwendete Schriften: <i>Myriad Pro</i> Mindestschriftgröße: 9 pt <i>(1,55 mm x-Höhe)</i> Mindestzeilenabst.: 3,3 mm	Datum: 05.02.2020 Version: 02 SB: TKU PR: JTI Seite: 1 / 2 EAN geprüft und lesbar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Freigabe:
---	---	--	---	--



