

Листовка: информация за потребителя

# НЕО-АНГИН® без захар

1,20 mg/0,60 mg/5,72 mg таблетки за смучене

2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол

## neo-angin® sugar-free

1,20 mg /0,60 mg /5,72 mg lozenges

2,4 - dichlorobenzyl alcohol/amylnmetacresol/levomenthol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

### Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява нео-ангин® без захар и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете нео-ангин® без захар
3. Как да приемате нео-ангин® без захар
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате нео-ангин® без захар
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### 1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

### 2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР

#### Не приемайте нео-ангин без захар

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на нео-ангин® без захар
- При деца под 6 годишна възраст

#### Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

нео-ангин® без захар не е подходящ за приложение при деца под 6 годишна възраст. Прилагането на лекарствения продукт при малки деца може да доведе до бронхоспазм и гърчове.



### Други лекарства и нео-ангин® без захар

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително такива, отпускани без рецепта.

Не са известни взаимодействия с други лекарства при перорален прием.

### нео-ангин® без захар с храни и напитки

нео-ангин® без захар може да се приема независимо от храненията.

### Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Няма клинични данни за влиянието на нео-ангин® без захар по време на бременност и кърмене и затова този продукт трябва да се приема внимателно от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно напълно да се изключи рискът за плода. Ето защо, ако сте бременна, моля консултирайте се с Вашия лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

### Шофиране и работа с машини

нео-ангин® без захар не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

### Важна информация относно някои от съставките на нео-ангин® без захар

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

Този лекарствен продукт съдържа изомалт. Моля приемайте нео-ангин® без захар само след консултация с лекар, в случай, че Ви е известно, че страдате от непоносимост към някои захари.

Една таблетка за смучене съдържа 2,6 g изомалт, съответващ на приблизително 0,13 хлебни единици.

Това трябва да се вземе предвид, ако спазвате диета за диабет. Калорийната стойност е 2,3 kcal/g изомалт. Изомалт може да има лек лаксативен ефект.

нео-ангин® без захар съдържа оцветителя кохинил червено А (E 124), който може да причини алергични реакции, включително астма. Тези реакции се срещат най-често при хора, които имат свръхчувствителност към ацетисалицилова киселина.

### 3. КАК ДА ПРИЕТЕ НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР

Винаги приемайте нео-ангин® без захар точно както е указано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, спазвайте следните указания:



Възрастни и деца над 6 годишна възраст трябва да приемат по 1 таблетка за смучене на всеки 2-3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.

#### Продължителност на лечението

Трябва да се свържете с Вашия лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3-4 дни.

#### Ако сте приели повече от необходимата доза нео-ангин® без захар

Няма съобщения за случаи на предозиране.

#### Ако сте пропуснали да приемете нео-ангин® без захар

Ако сте пропуснали да приемете или сте приели по-малко от необходимата доза нео-ангин® без захар, продължете да вземате лекарството според указанията.

#### Ако сте спрели употребата на нео-ангин® без захар

Няма опасност от възникване на някакви проблеми при спиране на употребата на нео-ангин® без захар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

#### 4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, нео-ангин® без захар може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Оценката на нежеланите реакции се базира на следната честота

Много често:	Повече от 1 от 10 пациенти
Често:	По-малко от 1 от 10 пациенти, но повече от 1 от 100 пациенти
Нечесто:	По-малко от 1 от 100 пациенти, но повече от 1 от 1000 пациенти
Редки:	По-малко от 1 от 1000 пациенти, но повече от 1 от 10000 пациенти
Много редки:	По-малко от 1 от 10000 пациенти, включително индивидуалните случаи

Много редки: възпаление на лигавицата на устата и стомаха  
Оцветителят кохинил червено А (Е 124) може да причини алергични реакции.

Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля да уведомите Вашия лекар или фармацевт.

#### 5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте нео-ангин® без захар след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и блистера. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.



Да се съхранява при температура под 30° С.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт, как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

#### 6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Какво съдържа нео-ангин® без захар

- **Активните вещества са:** 2,4-дихлоробензил алкохол 1,20 mg, амилметакрезол 0,60 mg, левоментол 5,72 mg
- **Другите съставки са:** Масло от звездовиден анасон, масло от лютива мента, изомалт, винена киселина, кохинил червено А (E124).

#### Как изглежда нео-ангин® без захар и какво съдържа опаковката

Червени, кръгли полупрозрачни таблетки за смучене.

Оригинална опаковка – картонена кутия с 16 и 24 таблетки за смучене в блистери от PVC/PVdC и алуминиево фолио.

#### Притежател на разрешението за употреба и производител:

Divapharma GmbH  
12274 Berlin  
Германия

#### Дата на последно одобрение на листовката

Април 2015

