

Листовка: информация за потребителя

НЕО-АНГИН® без захар

1,20 mg/0,60 mg/5,72 mg таблетки за смучене
2,4 - дихлоробензил алкохол/амилметакрезол/левоментол

neo-angin® sugar-free

1,20 mg /0,60 mg /5,72 mg lozenges
2,4 - dichlorobenzyl alcohol/amylnmetacresol/levomenthol

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство, точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 3-4 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка

1. Какво представлява Нео-ангин® без захар и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Нео-ангин® без захар
3. Как да приемате Нео-ангин® без захар
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Нео-ангин® без захар
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

За симптоматично лечение на леки инфекции в устната кухина, вкл. ларингити, фарингити, тонзилити, гингивити.

2. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА ПРИЕТЕ НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР

Не приемайте Нео-ангин® без захар

- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към някое от активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
- При деца под 6 годишна възраст

Предупреждения и предпазни мерки

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този продукт.

Нео-ангин® без захар не е подходящ за приложение при деца под

6 годишна възраст. Прилагането на лекарствения продукт при малки деца може да доведе до бронхоспазъм и гърчове.

Други лекарства и Нео-ангин® без захар

Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия с други лекарства при перорален прием.

Нео-ангин® без захар с храни и напитки

Нео-ангин® без захар може да се приема независимо от храненията.

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Няма клинични данни за влиянието на Нео-ангин® без захар по време на бременност и кърмене и затова този продукт трябва да се приема внимателно от бременни и кърмещи жени. Поради недостатъчна информация, не е възможно напълно да се изключи рискът за плода. Ето защо, ако сте бременна, моля консултирайте се с Вашия лекар преди приемането на този лекарствен продукт.

Шофиране и работа с машини

Нео-ангин® без захар не оказва влияние върху способността за шофиране и работа с машини.

Нео-ангин® без захар таблетки за смучене съдържат кохинил червено А (E124) и изомалт (E953)

Нео-ангин® без захар таблетки за смучене съдържат оцветителя кохинил червено А (E124), който може да предизвика алергични реакции.

Нео-ангин® без захар таблетки за смучене съдържат 2,58 g изомалт (E953), като заместител на захарта в една таблетка за смучене, което отговаря на 6 kcal (26 kJ).

Това трябва да се има предвид при болни със захарен диабет. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него преди да вземете този лекарствен продукт. Изомалт може да има слабо изразено слабително действие.

3. КАК ДА ПРИЕТЕ НЕО-АНГИН® БЕЗ ЗАХАР

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако не Ви е предписано друго от Вашия лекар, спазвайте следните указания:

Възрастни и деца над 6 годишна възраст трябва да приемат по 1 таблетка за смучене на всеки 2-3 часа. Таблетката трябва да се остави да се разтвори бавно в устата. Максималната дневна доза е 6 таблетки за смучене.

Bezeichnung: PB neo-angin zuckerfrei Inhalt: - Artikel-Nr.: 149491 Material-Nr.: 32 013 038 Druck-Kennz.: 09P0120 Laetus-Code: 67 AG-Nr.: - EAN-Code: - PZN-Code: - Land: BG Zeichn.-Nr.: -	Format: 190 x 210 mm Druckfarben: 1) ■ Black 2) 3) 4) 5) 6) 7)	Lackausparung: I) - II) - III) - IV) - V) - Lack: <input type="checkbox"/> Lackfrei: <input type="checkbox"/> Effekt-Lack: <input type="checkbox"/> Prägung: <input type="checkbox"/>	Verwendete Schriften: Myriad Pro Mindestschriftgröße: 9 pt (1,5 mm x-Höhe) Mindestzeilenabst.: 3,5 mm	Datum: 05.02.2020 Version: 02 SB: TKU PR: JTI Seite: 1 / 2 EAN geprüft und lesbar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Freigabe:
--	--	---	--	--

